

Informativa endodontica

La presente informativa vuole mettere a conoscenza del paziente le complicazioni possibili che si possono verificare durante tale tipo di trattamento.

Dopo l'anestesia del tipo tronculare può persistere per qualche giorno un leggero fastidio di tipo muscolo-articolare nei movimenti di apertura e chiusura della bocca e dopo la strumentazione del canale, relativamente alla patologia parodontica acuta siero-purulenta, possono presentarsi sintomi di dolore e/o gonfiore localizzato all'elemento dentario trattato e agli elementi limitrofi, con possibilità di gonfiore, fino a situazioni ascessuali.

Una volta effettuata l'otturazione canalare è possibile la permanenza, per tempi più o meno lunghi, di sensibilità localizzata all'elemento dentario, specialmente alla compressione dello stesso, sia in articolazione che per stimolazione con sensazione di allungamento dell'elemento dentale trattato.

Durante la preparazione dei canali è possibile che si fratturino gli strumenti endodontici all'interno dello stesso per i più svariati motivi, come eccesso di impegno all'interno del sistema canalare legato anche ad anatomie irregolari molto frequenti nel sistema dell'endodonto. Normalmente questo tipo di incidente non preclude il corretto trattamento e la otturazione del canale dell'elemento dentale, con prognosi comunque favorevole.

I denti devitalizzati risultano più fragili del normale, per la disidratazione relativa alla perdita della vitalità, per tale motivo risulta indispensabile a seconda della perdita di tessuto smalto dentinale, procedere ad una ricopertura protesica per l'alto percentuale di possibili fratture che determinerebbero sia la perdita del dente che l'inutilità del trattamento effettuato, nei tempi indicati dal professionista.

Nell'attesa va ricordato che sull'elemento trattato vanno evitate sostanze alimentari o atti che per la loro intensità ne possano provocare la frattura, che purtroppo resta anche situazione occasionale.